

Tiểu phẫu răng khôn hàm dưới

BÁC SĨ THÁI BẢO QUANG
KHOA RHM, BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ

Răng khôn hàm dưới

- Là răng cối thứ 3 hàm dưới (R 38 & R 48)
- Tuổi mọc khoảng 17 – 21 tuổi
- Là răng thường gây biến chứng nhất

Nhỏ răng khôn: tại sao ?

Biến chứng răng khôn lệch và ngầm gây ra:


- Bệnh nha chu
- Sâu răng
- Viêm lợi trùm
- Viêm mô tế bào
- U và nang



SÂU RĂNG DO RĂNG KHÔN



NHA CHU VIÊM DO RĂNG KHÔN



U NANG DO RĂNG KHÔN



VIÊM MÔ TẾ BÀO



Nhỏ răng khôn: khi nào

Chỉ định:

- Ngăn ngừa các biến chứng
- Nhỏ theo yêu cầu của chính hình
- Tuổi lý tưởng nhỏ là 17-20 tuổi

Nhổ răng khôn: khi nào

Chống chỉ định

- Tuổi : răng ngầm trong xương và tuổi trên 35 tuổi
- Tình trạng bệnh toàn thân
- Tổn thương các cấu trúc lân cận: thần kinh

Hướng dẫn trước khi phẫu thuật

- Không uống thuốc aspirin trong 10 ngày trước phẫu thuật
- Tránh hút thuốc uống rượu trong 12h trước phẫu thuật
- Ăn uống bình thường trước phẫu thuật

Cận lâm sàng trước phẫu thuật

- Xét nghiệm đông máu : TS_TC
- Phim XQ

Các bước phẫu thuật

- Vô cảm
- Tạo vạt: bộc lộ thích hợp vùng răng khôn
- Mở xương
- Cắt răng
- Nhổ răng đã được chia cắt
- Khâu đóng

Bước Vô cảm

Gây tê bằng phương pháp gây tê vùng (thần kinh xương ổ dưới) và tại chỗ niêm mạc má phía ngoài (dây thần kinh miệng)

Bước Tạo vạt

Tạo vạt tam giác bộc lộ răng cần nhổ



Bước Mở xương


Lượng xương lấy đi :

- Độ sâu răng
- Hình dạng chân răng
- Góc độ nghiêng của răng

Chia cắt răng

- Cho phép dùng nạy lấy từng phần răng qua lỗ xương đã mở
- Hướng chia cắt tùy thuộc vào:
 - độ nghiêng của răng khôn
 - dạng chân răng
 - mức độ ngàm



Độ nghiêng của răng khôn





Dạng chân răng



Mở xương và Chia cắt răng



Nạ để lấy răng



Khâu đóng

- Làm sạch vết thương
- Khâu đóng vật niêm mạc



Sau phẫu thuật

- Dặn dò sau nhổ
- Cho toa thuốc
- Tái khám cắt chỉ sau 7 ngày